تقويم التلقيحات

يتوجب القيام بالتلقيحات باقرب وقت ممكن
من الاهمية بمكان تقييم وضع التلقيحات لكافة الاعمار.
في حالة وجود نقص بالتلقيحات يتوجب القيام بها حالاً وفقاً للفئة العمرية وحسب التوصيات.

من توصيات الهيئة الدائمة للقاح (STIKO) لسنة 2015
www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT

Sprache: **Arabisch**

اللقاح / العمر	(بالاسابيع) 6	2	3	(بالاشهر) 4	11–14	15–23	(بالسنين) 2–4	5–6	7–8	9–14	15–17	من عمر 18	من عمر 60
			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
الكزاز		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	A2	A (٩) (كل عشرة اعوام ، تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)	A (٩) (كل عشرة اعوام ، تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)
الخناق		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	A2	A (٩) (كل عشرة اعوام ، تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)	A (٩) (كل عشرة اعوام ، تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)
السعال الديكي بيرتوسس		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	N	A2	A2	A (٩) (تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)	A (٩) (تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)
شلل الاطفال بوليوميلاتيس		G1	G2 (١)	G3	G4	N	N		N	A1	A1	N (تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)	N (تلقيح لحقي ان كان مطلوباً)
التهاب الكبد من النوع ب		G1	G2 (١)	G3	G4	N	N						
المستدميه هايموفيليس انفلونزاي نوع ب		G1	G2 (١)	G3	G4	N	N						
المكّورة الرئوية (ذ)		G1		G2	G3	N						S (ج)	
روتافايرسيس	G1 (ب)	G2		(G3)									
المكّورة السحائية المجموعه المصلية من النوع سي					G1 (من 12 شهر)	N					N		
الحصبة					G1	G2					N	S (د)	
النكاف الحصبة الالمانية					G1	G2					N		
الخُماق فايرسيلا					G1	G2					N		
الانفلونزا الانفلونزا												S (سنويا)	
فيروس الورم الحليمي البشري هيومين باببلومافيروس										G1 (٥)	G2 (٥)	N (٥)	

تواريخ التلقيحات التالية

Gefördert durch:
Bundesministerium für Gesundheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

ملاحظات توضيحية

- G **التلقيحات الاساسية** (لغاية 4 جرعات من لقاح ج1 – ج4)
- S **التلقيحات النموذجية**
- A **التلقيحات المعززة**
- N **التلقيحات اللحقية** (تلقيحات اساسية لكل من لم يتم تلقيحه قبلاً أو لتكملة سلسلة التلقيحات الناقصة)
- U **الفحص التشخيصي المبكر**
- J **فحص الشباب** (ج أي من عمر 12–14 سنة)

(١) هذه الجرعة غير مطلوبة عند استخدام لقاح احادي التكافؤ.

(ب) يجب القيام بالتلقيحات للمرة الاولى من عمرستة اسابيع. وبحسب نوع اللقاح، يتطلب ان يُعطى على شكل جرعتين او ثلاثة جرعات على فترات تتباعد عن بعضها باربعة اسابيع على الاقل.

(ج) يوصى اعطاء اللقاح ذو الجرعة الواحدة الذي يحتوي على لقاح البوليساكيرين، التلقيح المعزز لحالات معينة فقط.

(د) يعطى اللقاح ذو الجرعة الواحدة للاشخاص الذين تتراوح اعمارهم 18 سنة ، الذين لهم وضع تلقيحي غير واضح والذين ولدوا بعد عام 1970 ولم يتم تلقيحهم قبلاً او كانوا قد تلقوا تلقيحاً واحداً في طفولتهم. من المفضل تلقيحهم بلقاح النكاف/الحصبة/الحصبة الالمانية (ام ام ار).

(٥) التلقيحست النموذجي للفتيات تتراوح أعمارهم بين 9 ألى 13 أو 9 ألى 14 سنوات (اعتمادا على مادة اللقاح). لمعرفة عدد جرعات اللقاح انظر وصف المعلومات!

(٩) يعطى اللقاح المعزز للكزاز والخناق (تي دي) كل عشرة سنوات. ويعطى اللقاح التالي في موعده بجرعة واحدة مكونة من الكزاز/الخناق/السعال الديكي اللاخلوي (تي دي اي بي) أو، ان استدعى ذلك، على شكل مزيج من الكزاز/الخناق/السعال الديكي اللاخلوي – لقاح شلل الاطفال الغير مُنشط (تي دي اي بي – اي بي في).

(ذ) يتلقى الأطفال المبتسرين جرعة لقاح إضافية عند عمر ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 4 جرعات كمجموع كلي.