



IMPFKALENDER

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.

Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Sprache: Deutsch

Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission
(STIKO); 2015.
www.stiko.de

IMPFUNG	ALTER	Säuglinge				Kleinkinder (in Monaten)				Kinder (in Jahren)				Jugendliche				Erwachsene			
		6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	7–8	9–10	11–17	ab 18	ab 60							
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A1	N	A2	N	A	f							
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A1	N	A2	N	A	f							
Keuchhusten		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A1	N	A2	N	A	f							
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A1	N	A2	N	A	f							
Kinderalärnung		G1	G2	a	G3	G4	N				A1	N									
Polyomyelitis		G1	G2	a	G3	G4	N														
Hepatitis B		G1	G2	a	G3	G4	N														
Hib <i>Haemophilus influenzae Typ b</i>		G1	G2	a	G3	G4	N														
Pneumokokken	B	G1			G2	G3	N														
Rotaviren		G1	⑤	G2		(G3)															
Meningokokken Serogruppe C							G1 (ab 12 Monaten)		N												
Masern		G1			G2			N													
Mumps Röteln		G1			G2			N													
Windpocken Varizellen		G1			G2			N													
Grippe Influenza																					
HPV Humane Papillomviren																					

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
 - S** STANDARDIMPFUNG
 - A** AUFRISCHIMPFUNG
 - N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
 - U** Früherkennungsuntersuchung (U im Alter von 12–14 Jahren)
 - J** Jugenduntersuchung (J im Alter von 12–14 Jahren)
- ① Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- ② Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- ③ Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Aufrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- ④ Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- ⑤ Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- ⑥ Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- ⑦ Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- ⑧ Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Aufrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- ⑨ Gefördert durch:
-  Bundesministerium
für Gesundheit
- ⑩ aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages